

Identifier les principaux hyménoptères

Vous trouverez ci-dessous les principales espèces d'hyménoptères qui peuvent être confondues avec le frelon asiatique.

Le frelon asiatique est légèrement plus foncé et plus petit que le frelon européen. Il est principalement diurne contrairement au frelon européen qui est plutôt nocturne. Si un frelon vient tourner autour d'une source de lumière le soir, c'est qu'il s'agit d'un frelon européen.



Abeille domestique
(*Apis mellifera*)



Bourdon terrestre
(*Bombus terrestris*)



Guêpe commune
(*Vespula vulgaris*)



Frelon européen
(*Vespa crabro*)



Frelon asiatique
(*Vespa velutina*)

Pour plus d'informations :

Retrouvez nous sur www.neature.fr ou contactez nous au **02 22 66 63 00**
Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h30.

Reconnaître les nids des hyménoptères

Vous trouverez ci-dessous les principaux nids auxquels vous avez des chances d'être confrontés. Les nids de frelons européens et asiatiques sont assez similaires dans leur conception et peuvent se trouver dans des localisations similaires. Il est donc important de nous appeler en cas de doute : **02.22.66.63.00**.



Essaim d'abeilles

- Absence de nid primaire.
- Les essaims d'abeilles se rencontrent en grappe à la suite d'un essaimage.
- Lorsque l'essaim est visible comme sur la photo c'est qu'il vient d'essaimer. Dans ce cas, la priorité est d'appeler un apiculteur pour qu'il vienne le récupérer.
- Les essaims d'abeilles se rencontrent également très souvent dans les cheminées.



Nid de bourdons

- Absence de nid primaire.
- Les nids de bourdons se trouvent majoritairement dans le sol.
- Les bourdons sont inoffensifs et pollinisateurs, il n'y a donc aucun intérêt à éliminer leur nid.



Nid de guêpes

- Présence d'un nid primaire.
- Les nids primaires sont souvent construits dans des endroits protégés des intempéries et du vent (abri de jardin, etc.).
- Les nids secondaires de guêpes se trouvent majoritairement dans des endroits abrités (talus, intérieur d'un bâtiment).
- Les guêpes polistes forment souvent des nids sur les velux des habitations.



Nid secondaire de frelons européens

- Présence d'un nid primaire.
- Les nids primaires sont souvent construits dans des endroits protégés des intempéries et du vent (abri de jardin, etc.).
- Les nids secondaires sont très souvent localisés dans des **endroits creux** : cheminée, arbre creu, talus.
- Le nid est très souvent ouvert en dessous.



Nid secondaire de frelons asiatiques

- Présence d'un nid primaire.
- Les nids primaires sont souvent construits dans des endroits protégés des intempéries et du vent (abri de jardin, etc.).
- Les nids secondaires sont construits dans des **endroits très variés** : arbres, haies, intérieur des bâtiments.
- Ce sont les seuls à se situer dans des arbres.
- Le nid est intégralement fermé et l'ouverture est située sur un côté.